

[I] 以下の問の (1) ~ (42) に当てはまる適切な数値またはマイナス符号(-)をマークしなさい。

(1) 方程式 $x^4 - 4x^3 - 16x^2 + 8x + 4 = 0$ …… ① がある。

(i) $x - \frac{2}{x} = t$ とおくと、①を t の式で表すと、

$$t^2 - \boxed{(1)} t - \boxed{(2)(3)} = 0 \text{ である。}$$

(ii) ①の方程式の解のうち、最も大きなものは $\boxed{(4)} + \sqrt{\boxed{(5)(6)}}$ である。

(2) 1つのさいころを2回投げて、1回目に出た目の数を a 、2回目に出た目の数を b とする。

円 C の方程式を $x^2 + y^2 + ax + by - 4 = 0$ とするとき、

(i) 円 C の半径が3である確率は $\frac{\boxed{(7)}}{\boxed{(8)(9)}}$ である。

(ii) 円 C の半径が3以上である確率は $\frac{\boxed{(10)(11)}}{\boxed{(12)(13)}}$ である。

(3) 円 O とこれに内接する三角形 ABC があり、 $AB = 2$ 、 $BC = 3$ 、 $\cos \angle ABC = \frac{1}{6}$ である。

円 O の B を含まない弧 AC 上に動点 P がある。ただし、 P は A 、 C とは一致しない。

(i) $AP = 1$ のとき、 $\triangle ACP$ の面積は $\frac{\sqrt{\boxed{(14)(15)}}}{\boxed{(16)}}$ である。

(ii) $\triangle ACP$ の面積が最大となるとき、 BP の長さは $\frac{\boxed{(17)} \sqrt{\boxed{(18)(19)}}}{\boxed{(20)}}$ である。

(4) 2次方程式 $x^2 + t^2x - 2t = 0$ (t は正の定数) の2つの解を α, β として,

$$P = \int_{-1}^2 \left\{ \left(x + \frac{1}{\alpha^2} \right) \left(x + \frac{1}{\beta^2} \right) + \frac{1}{\alpha\beta} \right\} dx \quad \text{とする.}$$

(i) P を t の式で表すと, $P = \boxed{(21)} + \frac{\boxed{(22)}}{\boxed{(23)}} \left(t^2 + \frac{\boxed{(24)}}{t^2} \right)$ である.

(ii) P は $t = \sqrt[4]{\boxed{(25)}}$ のとき, 最小値 $\boxed{(26)} + \frac{\boxed{(27)}\sqrt{\boxed{(28)}}}{\boxed{(29)}}$ をとる.

(5) $xy = 4$, $x \geq \frac{1}{2}$, $y \geq 1$ を満たす実数 x, y について,

$$Q = \left(\log_{0.5} x \right)^3 + \left(\log_{0.5} y - 1 \right)^3 \quad \text{とする.}$$

(i) Q は, $x = \boxed{(30)}\sqrt{\boxed{(31)}}$, $y = \sqrt{\boxed{(32)}}$ のとき, 最大値 $\frac{\boxed{(33)}\boxed{(34)}\boxed{(35)}}{\boxed{(36)}}$ をとる.

(ii) Q は, $x = \frac{\boxed{(37)}}{\boxed{(38)}}$, $y = \boxed{(39)}$ のとき, 最小値 $\boxed{(40)}\boxed{(41)}\boxed{(42)}$ をとる.

〔Ⅱ〕以下の間の $\boxed{(43)}$ ～ $\boxed{(57)}$ に当てはまる適切な数値またはマイナス符号(-)をマークしなさい。

容器 A に濃度 10% の食塩水 100 g が入っている。また容器 B には濃度 20% の食塩水 100 g が入っている。このとき次の操作 T を考える。

操作 T : 「容器 A から食塩水を x g 取り出し、容器 B に入れてよくかき混ぜて、容器 B から x g の食塩水を取り出して、容器 A に入れて再びよくかき混ぜる。」

操作 T を n 回 (n は自然数) くり返したときの容器 A, B の食塩水の濃度をそれぞれ a_n (%), b_n (%) とおく。ただし、濃度は質量パーセント濃度である。

$a_1 = 12$ (%) であるとき、

(1) x の値は $\boxed{(43)(44)}$ であり、 b_1 の値は $\boxed{(45)(46)}$ である。

(2) a_n, b_n を n の式で表すと、

$$a_n = \boxed{(47)(48)} - \boxed{(49)} \left(\frac{\boxed{(50)}}{\boxed{(51)}} \right)^{n-1}, \quad b_n = \boxed{(52)(53)} + \boxed{(54)} \left(\frac{\boxed{(55)}}{\boxed{(56)}} \right)^{n-1} \text{ である。}$$

(3) $b_n - a_n < 0.5$ を満たす最小の n の値は $\boxed{(57)}$ である。

〔Ⅲ〕以下の問の (58) ~ (65) に当てはまる適切な数値またはマイナス符号(-)をマークしなさい。

xy 平面上に点 $A(0, a)$ と曲線 $C: y = x^3 - kx^2$ がある。ただし、 a, k は正の定数とする。
点 A から曲線 C に接線 l を引く。

(1) $a = 3, k = 1$ のとき、接線 l の方程式は $y =$ (58) $x +$ (59) である。

(2) 接線 l が 2 本引けるとき、 a を k の式で表すと、 $a = \frac{1}{(60)(61)} k^{(62)}$ である。

(3) $t = a - 2k$ とおく。接線 l が 1 本、または 2 本引けるとき、 t の最小値は

(63)(64) $\sqrt{(65)}$ である。

[IV] 以下の間の (66) ~ (85) に当てはまる適切な数値またはマイナス符号(-)をマークしなさい。

1辺の長さが1の正四面体OABCがある。 $\overrightarrow{OA'} = 2\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB'} = 3\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC'} = 4\overrightarrow{OC}$ を満たす点をA', B', C'とする。点Oから平面A'B'C'に垂線 l をひく。 l と平面A'B'C'との交点をH, l と平面ABCとの交点をPとする。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とするとき、

(1) $\overrightarrow{OH} = \frac{\boxed{(66)}\boxed{(67)}}{\boxed{(68)}\boxed{(69)}} \vec{a} + \frac{\boxed{(70)}\boxed{(71)}}{\boxed{(72)}\boxed{(73)}} \vec{b} - \frac{\boxed{(74)}}{\boxed{(75)}\boxed{(76)}} \vec{c}$ である。

(2) $\frac{|\overrightarrow{OP}|}{|\overrightarrow{OH}|}$ の値は $\frac{\boxed{(77)}\boxed{(78)}}{\boxed{(79)}\boxed{(80)}}$ である。

(3) $\triangle APB$ と $\triangle ABC$ の面積の比は $1 : \boxed{(81)}\boxed{(82)}$ である。

(4) 四面体OAPBと四面体OA'B'C'の体積の比は $1 : \boxed{(83)}\boxed{(84)}\boxed{(85)}$ である。