

I. 以下の問いに答えよ。

(i) $0 \leq x < 2\pi$ のとき, 関数 $f(x) = 4\sqrt{3}\cos x - 4\sin x + 5$ は $x = \frac{(1) : (2)}{(3)}\pi$

で最大値 $\frac{(4) : (5)}{(7)}$ をとり, $x = \frac{(6)}{(7)}\pi$ で最小値 $\frac{(8) : (9)}{(7)}$ をとる。

(ii) 以下のようにして数列 $\{a_n\}$ を定義する。 $a_1 = 1$ とする。 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 曲線 $y = x^5$ 上の点 (a_n, a_n^5) における接線と x 軸との交点の x 座標を a_{n+1} とする。このとき, 数列 $\{a_n\}$ の漸化式は

$$a_{n+1} = \frac{(10)}{(11)} a_n$$

である。数列 $\{a_n\}$ の隣接する 2 項の差 $a_n - a_{n+1}$ が $\frac{1}{1000}$ 以下である自然数 n の最小値は $\boxed{(12) : (13)}$ である。ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。

II. A社は工場 F_A で商品 P_A を製造している。商品 P_A の製造費用を表す変数は、製造量 x の関数であるとする。この関数を $c(x)$ で表す。以下の分析を容易にするため、 $c(x)$ は区間 $x \geq 0$ を定義域とする関数とし、 $c(0) = 0$ とする。また、正の実数 u に対して、関数 $c(x)$ の $x = u$ における微分係数が定まるとき、その値を $x = u$ における限界費用といい、 $m(u)$ で表す。さらに、 $a(x) = \frac{c(x)}{x}$ と定め、正の実数 u に対して、 $a(u)$ を $x = u$ における平均費用という。ここで、

$$m(x) = x^2 - 8x + 17 \quad \dots \textcircled{1}$$

であることがわかったとする。

- (i) 区間 $x > 0$ において、限界費用が最小となる製造量を x_m で表すと $x_m = \boxed{(14)}$ であり、平均費用が最小となる製造量を x_a で表すと $x_a = \boxed{(15)}$ である。

(ii) $\int_{x_m}^{x_a+1} |m(x) - a(x)| dx = \frac{\boxed{(16)} - \boxed{(17)}}{\boxed{(18)}}$ である。

- (iii) この問では、限界費用 $m(x)$ を特定する式①は仮定しないことにする。その場合でも、ある $\bar{x} > 0$ に対して、平均費用 $a(x)$ が区間 $0 < x \leq \bar{x}$ において単調に減少するならば、すなわち、 $0 < u < v \leq \bar{x}$ ならば $a(u) > a(v)$ となるならば、

$$x_1 + x_2 \leq \bar{x}, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0$$

を満たす任意の x_1, x_2 に対して、

$$c(x_1 + x_2) < c(x_1) + c(x_2)$$

となることを証明せよ。(その証明は解答用紙Bの(ア)欄に記せ。)

- (iv) B社は工場F_Bで商品P_Aと同等な商品P_Bを製造している。商品P_Bの製造費用は、商品P_Aの製造費用と同じであるとする。すなわち、B社における商品P_Bの製造費用は、製造量xの関数c(x)で定まる。

ここで、A社がB社を買収したとし、商品の製造はA社が工場F_Aですべてまとめて行うこととする。(商品が同等なので、工場F_Aで製造した商品P_AをB社の顧客に提供しても何ら問題はない。また、このとき、工場F_Bにおける製造量は0になる。) 買収前と比較して、製造を集約することによって両社合わせた製造費用が節約される度合いを求めてみよう。

買収時点での商品P_Aと商品P_Bの製造量を、それぞれu₁とu₂(u₁>0, u₂>0)とする。このとき、節約される費用は、再び、限界費用m(x)に対して式①を仮定すると、

$$u_1u_2 \left(\boxed{\quad (イ) \quad} \right)$$

となる。(もしこの値が負となる場合は、製造費用は節約ではなく追加されることになる。)

III. 点Oを原点とする座標空間に2つの平面 π_1 と π_2 がある。平面 π_1 の方程式は, $x - 2y + 3z + 1 = 0$ であり, 平面 π_2 の方程式は, $3x + 4y - 7z - 5 = 0$ である。そして, 平面 π_1 と π_2 の交線を ℓ とする。

- (i) ある点の原点Oを基準とする位置ベクトル $\vec{p}_0 = (1, \boxed{(19)}, \boxed{(20)})$ と, 方向ベクトル $\vec{v} = (1, \boxed{(21)}, \boxed{(22)})$ を用いると,

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + t\vec{v}$$

は直線 ℓ のベクトル方程式である。ここで, \vec{p} は直線 ℓ 上の点の原点Oを基準とする位置ベクトルで, t は実数である。

- (ii) 点A(2, -8, 3)を中心とする球面 S を考える。球面 S と直線 ℓ が1点のみを共有するとき, その共有点の座標は $(\boxed{(23)}, \boxed{(24)} : \boxed{(25)}, \boxed{(26)} : \boxed{(27)})$ である。また, 球面 S と直線 ℓ が異なる2点を共有し, その2つの共有点と点Aを頂点とする三角形の面積が $24\sqrt{35}$ であるとき, その2つの共有点の座標は, $(\boxed{(28)} : \boxed{(29)}, \boxed{(30)} : \boxed{(31)} : \boxed{(32)}, \boxed{(33)} : \boxed{(34)} : \boxed{(35)})$ と $(\boxed{(36)}, \boxed{(37)} : \boxed{(38)}, \boxed{(39)})$ である。

- (iii) 直線 ℓ は x 軸に平行な平面 π_3 と y 軸に平行な平面 π_4 の交線でもある。このとき, 平面 π_3 の方程式は

$$\boxed{\text{(ウ)}} = 0$$

であり, 平面 π_4 の方程式は

$$\boxed{\text{(エ)}} = 0$$

である。(これらの方程式はできる限り簡単な形にせよ。)

IV. 箱の中に赤玉5個、青玉4個、白玉3個が入っている。玉には1から5までの整数のいずれか1つが書かれており、赤玉には1, 2, 3, 4, 5の各数が1つずつ、青玉には1, 2, 3, 4の各数が1つずつ、白玉には1, 2, 3の各数が1つずつ書かれている。

この箱から太郎が玉を1個取り出し、その玉を箱に戻さず残りの玉から花子が1個取り出す。このとき、玉に書かれた数が同じならば、おのおのが自分が取り出した玉を獲得し、異なるならば、大きい数が書かれた玉を取り出した方が両方の玉を獲得するゲームを行う。

(i) このゲームにおいて、太郎が1個の玉を獲得する確率は $\frac{(40)}{(41) \vdots (42)}$

であり、花子が2個の玉を獲得する確率は $\frac{(43) \vdots (44)}{(45) \vdots (46)}$ である。そして、花子が2個の玉を獲得したとき、玉に書かれた数の差の絶対値が n である確率を p_n とすると、

$$\sum_{n=1}^4 np_n = \frac{(47) \vdots (48) \vdots (49)}{(50) \vdots (51)}$$

である。

(ii) このゲームにおいて、太郎が少なくとも1個の赤玉を獲得する確率は $\frac{(52) \vdots (53)}{(54) \vdots (55)}$ である。

(iii) このゲームを2回繰り返すことを考える。1回目のゲームで獲得した玉を箱に戻さず、続けて2回目のゲームを行ったとき、太郎が2回とも同色の玉を取り出す確率は $\frac{(56) \vdots (57)}{(58) \vdots (59)}$ である。また、花子が2回のゲームを通じて獲得した玉に書かれた数の和が15となる確率は $\frac{(60)}{(61) \vdots (62) \vdots (63)}$ である。